

Fenbendrops® flacon met 90 ml

Samenstelling

Diergeneesmiddel bestemd voor toepassing bij kooi- en volièrevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

*Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzondering Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228.

Bevat per ml: 20 mg fenbendazol

Beschrijving

Fenbendazol is een anthelminticum en behoort tot de groep van breedspectrum benzimidazolen. Benzimidazolen hebben een biocide effect. Resistentie onder praktijkomstandigheden wordt regelmatig waargenomen.

Indicaties

Fenbendazol en werkzame metabolieten zijn werkzaam tegen longwormen en larvale stadia van darmnematoden in de weefsels. Gevoelig zijn onder meer *Taenia* spp., *Osierus osieri*, *Aelustrongylus abstrusus*, *Angiostrongylus vasorum*, *Capillaria aerophila*, *Ollulanus tricuspis*, *Physaloptera rara* en *Paragonimus kellicotti*. Fenbendazol is tevens werkzaam tegen *Syngamus trachea* (luchtpijpworm) en tegen *Giardia* spp. Bij knaagdieren wordt fenbendazol gebruikt voor de behandeling van *Encephalitozoon cuniculi*.

Contra-indicaties

Fenbendazol kan stoornissen in de veergroei veroorzaken. Daarom liever niet toepassen kort voor of tijdens de rui.

Toepassing

Gebruik tijdens dracht en lactatie

In tegenstelling tot andere benzamidazolen is fenbendazol veilig voor gebruik bij drachtige dieren.

Toedieningswijze & dosering

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!

Uitsluitend voor orale toediening.

Dosering:

Kooi- en volièrevogels:

20 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen of 40-60 mg per kg lichaamsgewicht éénmalig, te herhalen na 14 dagen. Bij *Syngamus trachea* heeft de dosering van 20 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen de voorkeur.

Knaagdieren:

20 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen of 40-60 mg per kg lichaamsgewicht éénmalig, te herhalen na 14 dagen. Bij een besmetting met *Encephalitozoon cuniculi* is de behandeling 20 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 28 dagen. Bij een besmetting met *Giardia* spp. is de behandeling 40-60 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen.

Waarschuwingen

Geen.

Bijwerkingen

Herhaalde toediening van hoge(re) doses kan aanleiding geven tot lever- en maagklachten en beenmergdepressie.

Bewaring

In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking

Flacon met 90 ml met doseerspuit

Registratiehouder

AST Farma BV, Oudewater

Fabrikant

Produlab Pharma BV, Raamsdonksveer