

CARPROFEN DROPS

Diergeneesmiddel bestemd voor terrarium-dieren, kooi- en volièrevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

Samenstelling

Bevat per ml: 4 mg carprofen.

Beschrijving

Carprofen is een NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug) uit de groep van arylpropionzuurderivaten. De ontstekingsremmende en antiflogistische werking berust op een remming van het enzym cyclo-oxygenase. Wanneer er beschadiging van weefsels optreedt, komt er arachidonzuur vrij dat door het enzym cyclo-oxygenase omgezet wordt in onder meer prostaglandine E. Dit is een mediator die een veelheid van ontstekingsreacties kan veroorzaken, waaronder activering van het complementsysteem. Behalve prostaglandinen worden uit arachidonzuur ook leukotriënen gevormd; deze stoffen spelen onder meer een rol bij chemotaxis en bij hyperreactiviteit van longweefsel. Door remming van cyclo-oxygenase zal de productie van prostaglandinen afnemen, hetgeen zich klinisch zal uiten in afname van pijn, daling van temperatuur en vermindering van lokale verschijnselen als roodheid en zwelling.

Indicaties

Symptomatische pijnbestrijding en remming van de acute ontstekingsreactie bij zowel acute aandoeningen alsook acute opflukeringen van chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Contra-indicaties

- toediening aan drachtige of lacterende dieren;
- acute of chronische aandoeningen van het maag- en/of darmslijmvlies;
- nierinsufficiëntie;
- afwijkende bloedstolling.

Bijwerkingen

De bijwerkingen die kunnen optreden zijn kenmerkend voor NSAIDs, zoals occult bloedverlies, gebrek aan eetlust, diarree, braken, apathie, jeuk, dorst en bloed in de urine. Veelal zijn deze symptomen van voorbijgaande aard. Indien deze symptomen niet ophouden dient stopzetting van de behandeling overwogen te worden.

Wisselwerkingen met andere diergeneesmiddelen

- niet gelijktijdig toedienen met andere ontstekingsremmende middelen;
- niet combineren met antibiotica van de aminoglycoside groep;
- niet combineren met anticoagulantia en andere middelen met een risico voor ulceratie/bloedingen van het slijmvlies van het maagdarmkanaal.

Toedieningswijze en dosering

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!

Uitsluitend voor orale toediening.

De dosering bedraagt 2 mg carprofen per kg lichaamsgewicht, 2 x daags (= 0,5 ml per kg lichaamsgewicht, 2 x daags), gedurende minimaal 7 dagen.

Bij langdurige behandeling kan getracht worden de dosering te verminderen of zelfs te halveren.

Bewaring

In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking

Flacon met 10 ml of 30 ml.

Status 01.2002.

Versie 02

* Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228)

Fabrikant: Produlab Pharma, Raamsdonksveer