

Oto-aid

Indicaties :

Bij de hond: behandeling van een acute uitwendige oorontsteking en van de verergering, op korte termijn, van de acute symptomen
van een chronische uitwendige oorontsteking van bacteriële en fungale oorsprong veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor gentamicine, zoals *Staphylococcus intermedius* en door schimmels die gevoelig zijn voor clotrimazol, *Malassezia pachydermatis* in het bijzonder.

Contra-indicaties :

Niet toedienen aan drachtige en lacterende teven. Niet toedienen aan honden met een geperforeerd trommelvlies. Niet toedienen aan honden met een gekende overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Het product niet gelijktijdig toedienen met andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze ototoxiciteit kunnen veroorzaken.

Bijwerkingen:

Erythematische papels kunnen lokaal verschijnen; deze laesies verminderen wanneer de behandeling wordt stopgezet. Een tijdelijke vermindering van het gehoor en uiterst zeldzame gevallen van irreversibel gehoorverlies werden vooral bij oudere dieren waargenomen. In het geval van auditieve of vestibulaire disfunctie moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en het oorkanaal voorzichtig worden gereinigd met een niet-ototoxische oplossing. Bij langdurig en overmatig gebruik van producten die corticosteroïden bevatten voor lokale toediening is het bekend dat ze lokale en systemische bijwerkingen kunnen veroorzaken. Deze omvatten onderdrukking van de bijnierfunctie, verdunning van de opperhuid en vertraagde wondheling.

Dosering en toedieningsweg:

Enkel voor gebruik in het oor. Het product goed schudden voor toediening. Honden die minder wegen dan 15 kg: 4 druppels in het oor tweemaal per dag. Honden die meer wegen dan 15 kg: 8 druppels in het oor tweemaal per dag. De duur van de behandeling bedraagt 7 dagen. Na toediening mag de basis van het oor kort en zacht gemasseerd worden om het product te laten doordringen tot het lagere deel van het oorkanaal. Eén druppel van het geneesmiddel bevat 66,9 IE gentamicine, 22,3 µg betamethason en 223 µg clotrimazol.

Intervet Belgium nv
Stallestraat 73
1180 Brussel
Tel: 02 370 94 01
Fax: 02 370 93 55