

# Activyl spot on hond



**Samenstelling** Bevat per pipet resp. 99,45 / 150,15 / 300,3 / 600,6 / 900,9 mg indoxacarb

**Eigenschappen** Indoxacarb is een ectoparasiticide behorende tot de chemische groep oxadiazine. Na omzetting in een metaboliet is indoxacarb werkzaam tegen volwassen, larvale en eistadia van insecten. Bij vlooien is voor indoxacarb naast het dodend effect op volwassen vlooien ook effectiviteit tegen de zich ontwikkelende larvale stadia in de directe omgeving van het behandelde dier aangetoond.

**Doeldier** Hond

**Indicaties** Vlooiënbestrijding

**Toediening/dosering** De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,077 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt overeenkomstig het gewicht van de hond:

| Gewicht van de hond (kg) | Te gebruiken grootte van de pipet                 | Volume (ml) | Indoxacarb (mg/kg) |
|--------------------------|---|-------------|--------------------|
| < 6,5                    | Activyl spot-on oplossing voor zeer kleine honden | 0,51        | Minimum van 15     |
| 6,6 - 10                 | Activyl spot-on oplossing voor kleine honden      | 0,77        | 15 - 23            |
| 10,1 - 20                | Activyl spot-on oplossing voor middelgrote honden | 1,54        | 15 - 30            |
| 20,1 - 40                | Activyl spot-on oplossing voor grote honden       | 3,08        | 15 - 30            |
| 40,1 - 60                | Activyl spot-on oplossing voor extra grote honden | 4,62        | 15 - 23            |

**Contra-indicaties** Geen

**Bijwerkingen** Incidenteel kan een korte periode van speekselen voorkomen als het dier de plaats van toediening direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum beperken. Tijdelijk krabben of haaruitval op de plaats van toediening kan voorkomen. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling. De toediening van het product kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het middel. Er zijn geen bijwerkingen waargenomen bij honden vanaf een leeftijd van 8 weken, die 8 keer een vijfvoudige dosering toegediend kregen met intervallen van 4 weken, of die 6 keer een vijfvoudige dosering toegediend kregen met intervallen van 2 weken.

**Waarschuwingen** De veiligheid van Activyl is niet aangetoond bij honden jonger dan 8 weken en lichter dan 1,5 kg. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Niet gebruiken tijdens de dracht en bij fokdieren. Het gebruik wordt niet aanbevolen tijdens de lactatie.

**Voorzorgen** Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Het sachet is kindveilig. Houd het product tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product. Houd de gebruikte pipet buiten het zicht en bereik van kinderen. Was de handen direct na gebruik. Het product bevat indoxacarb. Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen dit product niet te gebruiken. Vermijd contact met de ogen aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch optreedt. Dit product is zeer brandbaar. Houd het op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Het product blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en blootstelling aan zonlicht. De dieren mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling.



# Activyl spot on hond

vervolg

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Bewaarcondities/ Houdbaarheid | Bewaren in originele verpakking. Houdbaar tot 4 jaar na productiedatum.  |
| Verpakking                    | Doos à 4 pipetten  |
| Registratienummer             | REG NL 106293  |
| Kanalisatie                   | UDA  |
| Artikelnummer                 | 90.001.50 Activyl spot-on hond XS (6,5 kg) 4 pipet<br>90.001.51 Activyl spot-on hond S (6,6 - 10 kg) 4 pipet<br>90.001.52 Activyl spot-on hond M (10,1 - 20 kg) 4 pipet<br>90.001.53 Activyl spot-on hond L (20,1 - 40 kg) 4 pipet<br>90.001.54 Activyl spot-on hond XL (40,1 - 60 kg) 4 pipet |