

Diergeneesmiddel vrijgesteld van registratie.

Dosering: Myiasis in konijnen en cavia's wordt veroorzaakt door vliegen die eitjes in plakkende feces leggen. Verwijder de feces en zorg voor goede hygiëne in het hok. Spray de juiste hoeveelheid van de vloeistof aan de achterzijde, van het midden van de rug tot aan het puntje van de staart. De oppervlakte onder de staart en tussen de achterpoten van het konijn verdienen extra aandacht. Behandel vroeg in de zomer, voordat er vliegen zijn.



Gewicht in kg	Aantal keer sprayen
0.5 - 1.0	5
1.0 - 1.5	7
1.5 - 3.0	9
> 3.0	15

Het dier baden kan de werking van het middel verminderen en kan meer frequente toediening vereisen. De behandeling niet binnen 4 weken herhalen.

Distributeur:

Fendigo NV/SA
Herrmann Debrouxlaan 17
1160 Brussel, België

Fabrikant:

Beaphar B.V. Raalte Nederland

Myiasis Spray

Voor konijnen en cavia's

Tegen maden

Myiasis spray, oplossing voor konijnen en cavia's

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Konijnen, cavia's ouder dan 3 maanden

Samenstelling: Ivermectine 0.5 mg/ml

Indicaties: Preventie en behandeling van myiasis, veroorzaakt door de blauwgroene bromvlieg (*Lucillia sericata*).

Contra-Indicaties: Niet gebruiken bij konijnen jonger dan 8 weken. Niet gebruiken op beschadigde huid. Niet gebruiken bij zieke of zwakke dieren, bij zwangerschap, lactatie, leg of zogende dieren.

Bewaren: Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur. Niet gebruiken na de uiterste datum vermeld op de flacon. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Charge/ EXP:

75 ml

336507-A