

Vitaminthe

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Vitaminthe ontwormpasta

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen
per ml:

Werkzaam bestanddeel:

niclosamide 240 mg

oxibendazol 30 mg.

Indicatie(s)

spoelwormen: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*;

zweepwormen: *Trichuris vulpis*;

haakwormen: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*;

lintwormen: *Dipylidium* spp. of *Taenia* spp.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Voorzorgen

Dracht: Tijdens de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het lichaam hiermee niet bereikt worden

Lintwormen (*Dipylidium Caninum*) worden overgebracht door vlooiën. Herbesmetting wordt voorkomen door ook vlooiën optimaal te bestrijden, zowel het dier als de omgeving.

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden.

Bijwerkingen

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Eenmalig 15 mg oxibendazol en 120 mg niclosamide per kg lichaamsgewicht (dit komt overeen met 1 ml per 2 kg lichaamsgewicht).

Toedieningswijze: Vitaminthe dient in een éénmalige dosering achter op de tong van het dier te worden ingegeven.

De benodigde hoeveelheid kan ook door wat voedsel gemengd worden.

Ontwormingsschema

Het ontwormingsschema komt overeen met het uniforme advies van de ESCCAP (European Scientific Council Companion Animal Parasites: www.esccap.org). Altijd alle honden en katten in huis tegelijk ontwormen.

Drachtige dieren: tijdens de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het lichaam hiermee niet bereikt worden.

Lacterende dieren: na de geboorte dient het moederdier tegelijk met de behandeling van de zogende pups of kittens ontwormd te worden.

Pups: behandelen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken. Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden.

Kittens: behandelen op een leeftijd van 3, 5, 7 en 9 weken. Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden.

Alle andere honden en katten: minimaal 4 keer per jaar ontwormen en indien wormen in ontlasting en/of braaksel waargenomen worden.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

Anderhalf jaar na productiedatum, mits bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard.

Speciale waarschuwingen

Niet toedienen aan drachtige dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 maart 2010

Overige informatie**Attentie**

In verband met het risico van spugen/braken kort na toediening, dient vermeden te worden dat dit kan gebeuren op tapijt of ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig mogelijk reinigen met uitsluitend schoonwater zonder reinigingsmiddelen.

Verpakking

Doosje met 1 injector 5 ml (1 doseerstreep = ¼ ml)
Doosje met 1 injector 10 ml (1 doseerstreep = 1 ml)
Doosje met 1 injector 25 ml (1 doseerstreep = 5 ml)

Registratienummer: REG NL2896